

Additiva Vitamin C Lemon Effervescent tablets

Effervescent tablet with vitamin C, food supplement with sweeteners, lemon flavour

Additiva Vitamin C Lemon contains
1000 mg Vitamin C per tablet (4 g), correspond to %1250 RDA per tablet
RDA = Recommended Daily Allowance

Other ingredients:

Acidifier citric acid, Sodium Hydrogen Carbonate, Vitamin C, Inulin, Starch, Flavouring, Modified starch, Sweetener aspartame, Sweetener acesulfame-K, Colouring agent Riboflavine5'-phosphate

Additiva Vitamin C Lemon contains salt.

Additiva Vitamin C Lemon is a source of phenylalanine. Contains Aspartame!, not suitable for persons with phenylketonuria.

Indication:

Vitamin C is needed as part of the body's defences. Vitamin C helps support the body's immune system. ADDITIVA Vitamin C is used in case of vitamin C deficiency, for the maintenance of normal function of the immune system during and after extreme physical exercise, in case of cold & flu .

Other information:

Fresh fruit and vegetables contain a sufficiently high amount of vitamin C. However, when stored for longer periods the vitamin C can be lost to varying degrees, particularly in potatoes and vegetables. Besides a poor or deficient diet, extreme physical illness can lead to vitamin C deficiency. A very severe form of vitamin C deficiency is scurvy, which is accompanied by weakness and bleeding throughout the body and is treated medically with vitamin C.

Don't take ADDITIVA Vitamin C Lemon

- if you are allergic to ascorbic acid (vitamin C) or any of the other ingredients of this medicine
- if you suffer from kidney stones (oxalate) unless advised by your doctor.
- if you suffer from certain illnesses where too much iron is absorbed by the body (thalassaemia, haemochromatosis, sideroblastic anaemia).

Warnings & Precautions:

Take special care with Additva Vitamin C Lemon

If you take an increased dose of vitamin C over prolonged periods, a lack of vitamin C is possible when stopping the treatment.

If you are at risk of recurring formation of kidney stones (calcium oxalate calculi), you should not exceed a daily vitamin C-intake of 100 to 200 mg. If you suffer from severe kidney disease (dialysis patients), do not take a daily vitamin C dose exceeding 50 to 100 mg of vitamin C. Avoid high vitamin C doses if you suffer from renal failure. If you suffer from hereditary disorders of red blood cells (e. g. Glucose-6-Phosphate dehydrogenase deficiency), do not exceed the recommended dose (1000mg per day).

The administration of gram doses can elevate the ascorbic acid concentration in the urine to such a degree that the measurement of various clinical-chemical parameters (glucose, uric acid, creatinine, inorganic phosphate) is impaired. Likewise, gram doses can lead to false-negative results in the attempted detection of occult blood in the stools. Generally, chemical detection methods which are based on colour reactions can be affected.

Do not take Additiva Vitamin C Lemon before asking your doctor for advice if you are pregnant or breast-feeding.

Children and adolescents:

Additiva Vitamin C Lemon is not intended for use in children and adolescents (below 18 years).

Keep out of reach of children

Instruction of use:

Take 1 tablet per day. The stated daily dose of 1 effervescent tablet is not to be exceeded

Dissolve one effervescent tablet per day in a glass of water and drink - makes a refreshing beverage.

Side effects:

Additiva Vitamin C Lemon is well tolerated, even at high dosages. After very high doses (5 - 4 g or more) mild diarrhoea or increased urinary frequency has occasionally been seen.

Hypersensitivity reactions can occur such as

- breathing difficulties
- allergic skin reactions

Storage condition:

Store in a cool, dry place in a temperature between °15C - °25C
Close well after usage. Use within 3 months of opening the pack.

Package:

Plastic tube contains 20 effervescent tablets / 80g

Last revision date: July 2014

Manufacturer:

Dr. B. Scheffler Nachf. GmbH & Co. KG
Senefelderstraße 44
51469 Bergisch Gladbach
Germany

(This is medicament)
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instruction is dangerous for you.
- Strictly follow the doctor's prescription, the method of use, and the instruction of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not interrupt the treatment period without consulting your physician.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
Council of Arab health ministers and union of Arab pharmacists .

ADDITIVA[®] Vitamin C Lemon

Effervescent tablets

as a food additive
with sweeteners

Average nutritional value

	Per 100 g	Per tablet 4.0 g
Energy		
KJ	933	37
Kcal	216	9
Fat	<0.1 g	<0.01 g
of which saturates	<0.1 g	<0.01 g
Carbohydrate	2.8 g	0.1 g
of which sugars	0.6 g	<0.1 g
Fibre	6.1 g	0.2 g
Protein	0.2 g	<0.1 g
Salt	18.18 g	0.73 g



Dr. Scheffler[®]

ADDITIVA[®]

Vitamin C

نكهة الليمون

أقراص فوارة

مكمل غذائي
مع المحليات

تعريف المواد الغذائية

الغذاء القرص ع (6.0)	الغذاء 100 غ
37	933
9	216
0 01 > ج	0 1 > ج
0 01 > ج	0 1 > ج
0 1 ج	2 8 ج
0 1 > ج	0 6 ج
0 2 ج	6 1 ج
0 1 > ج	0 2 ج
0 73 ج	18 18 ج

المكونات الأخرى
المحتويات: حامض الستريك محمض، كربونات هيدروجين الصوديوم، فيتامين سي، سكري، نشاء، نكهة، نشاء معدّل، أسبارتام للتخلية، أسيولفام - ك للتخلية، مادة ملونة ريبوفلافين-5-غوسفات
أدبتيقا فيتامين سي بطعم الليمون يحتوي على الملح.
أدبتيقا فيتامين سي بطعم الليمون هو مصدر للفيتامين الينين! يحتوي على أسبارتام، غير صالح للأشخاص المصابين بالفينيل كيتوتيورينا.

الاستطبابات

هناك حاجة إلى فيتامين سي كجزء من دفاعات الجسم. يساعد فيتامين سي في دعم جهاز المناعة في الجسم.
يستخدم فيتامين سي في حالات نقص فيتامين سي، للحفاظ على الوظيفة العادية للجهاز المناعة أثناء وبعد ممارسة الرياضة البدنية الشديدة، في حالة البرد والانفلونزا.

معلومات أخرى

الفاكهة والخضروات الطازجة تحتوي على كمية عالية وكافية من فيتامين سي ومع ذلك، عند تخزينها لفترات طويلة يمكن أن تضعف كمية فيتامين سي بمرور الوقت ولا سيما في البطاطس والخضروات.
بالإضافة إلى سوء أو نقص التغذية، يمكن للضعف الجسدي أن يؤدي إلى نقص فيتامين سي. الإسفروب هو الشكل الحاد جدا من نقص فيتامين سي، الذي يكون مصاحبا لضعف وتزيف في جميع أجزاء الجسم ويتم التعامل طبيا باستخدام فيتامين سي.

لاتأخذ أدبتيقا فيتامين سي بطعم الليمون

إذا لديك حساسية من حمض الاسكوربيك (فيتامين سي) أو أي من المكونات الأخرى من هذا المستحضر. -
بالذالك. إذا كنت تعاني من حمض الكلى (أوكسالات) إلا إذا نصح الطبيب -
- إذا كنت تعاني من بعض الأمراض حيث يتم امتصاص الكثير من الحديد في الجسم (الثلاسيميا، الاصطباغ الدموي وقرص الدم الحديدي الأرومات).

التحذيرات والاحتياطات

اتباع العناية الخاصة مع أدبتيقا فيتامين سي بطعم الليمون

إذا كنت تأخذ جرعة زائدة من فيتامين سي على مدى فترات طويلة، يمكن أن يحدث نقص فيتامين سي عند وقف العلاج.
إذا كنت في خطر تكوين حصص الكلى (حسابات أوكسالات الكالسيوم) المتكررة، يجب أن لا تتجاوز تناول 100 ملجم من فيتامين سي يوميا.
إذا كنت تعاني من مرض الكلى الحاد (مرضى غسيل الكلى)، لا تأخذ جرعة فيتامين تتجاوز 50 ملجم يوميا. تجنب الجرعات العالية من فيتامين سي إذا كنت تعاني من الفشل الكلوي. إذا كنت تعاني من اضطرابات وراثية في خلايا الدم الحمراء (مثل نقص جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز) لا تتجاوز الجرعة الموصى بها (1000 ملجم يوميا).
إن استخدام جرعات 1 غرام يمكن أن ترفع تركيز حمض الاسكوربيك في البول إلى درجة أن يحدث انخفاض في قيمة قياسات المعايير السريوية والكيميائية المختلفة (الجلوكوز وحمض اليوريك والكرياتينين والفوسفات غير العضوي). وبالمثل، يمكن للجرعات 1 غرام أن تؤدي إلى نتائج سلبية كاذبة في محاولة الكشف عن الدم الخفي في البراز. عموما، طرق الكشف الكيميائية التي تقوم على ردود فعل اللون يمكن أن تتأثر.
لاتأخذ أدبتيقا فيتامين سي بطعم الليمون قبل استشارة الطبيب إذا كنت حامل أو الرضاعة الطبيعية.

الأطفال والمراهقين

أدبتيقا فيتامين سي بطعم الليمون غير معد للإستخدام في الأطفال والمراهقين (أقل من 18 سنة)

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

تعليمات الإستخدام

خذ قرص واحد يوميا، لا ينبغي تجاوز الجرعة اليومية المعلنه 1 قرص فوار
يشرب قرص واحد يوميا بعد إذابته في كوب ماء أو شراب - مشروب منعش ولذيذ

الأثار الجانبية

أدبتيقا فيتامين سي بطعم الليمون جيد التحمل، حتى في الجرعات العالية. بعد الجرعات العالية جدا (5-4 جم أو أكثر) يمكن مشاهدة إسهال خفيف أو زيادة تكرار البول.
يمكن أن تحدث تفاعلات فرط الحساسية مثل
- صعوبات في التنفس
- ردود فعل حساسية الجلد

ظروف التخزين

يخزن في مكان بارد وجاف في درجة حرارة بين 15 - 25 درجة مئوية
إغلق العبوة جيدا بعد الإستخدام. استخدم العبوة خلال 3 أشهر من فتحها


العبوة

أنبوب بلاستيكي يحتوي على 20 قرص فوار / 80 جم

تاريخ آخر مراجعة للنشرة يوليو 2014

الشركة المصنعة

د. بي شيفلر ناشف. جي إم بي إتش
سينفيلدور سترابي 44
51469 بيرجيش جلاباخ
المانيا



Dr. Scheffler[®]

إن هذا الدواء

- يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك فيما الخبيران بالدواء ونفعه و ضرره.
- لا تطعم مده العلاج المحدده لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب .
مجلس وزراء الصحة العرب وإتحاد الصيدلة العرب